



PROSTAGLANDIINI KÄYNNISTÄÄ PORSIMISEN

Prostaglandiini-hormoni erittyy normaalisti kohdun lihaksista tiineyden lopulla ja sen tehtävä on

- Lopettaa munasarjojen keltarauhasen toiminta
- Sitä kautta edesauttaa kohdun lihaksiston supistuksia
- Käynnistää porsiminen noin vuorokaudessa
- Osittain myös laukaista pesäntekokäyttäytyminen

Miksi käynnistämistä käytetään?

- Ajoitetaan porsimiset päiväsaikaan muutamalle päivälle, helpottaa työjärjestelyjä porsimisten valvonnassa
- Emakkojen porsieissa samaan aikaan, on helppo tasata pahnueita

Mitä haittavaikutuksia prostaglandiinilla on?

- Lisääntynyt maitokuumeriski
- Porsaas syntyvät epäkypsinä
- Porsaskuolleisuuden riski nousee
- Syntyy enemmän sammakkoporsaita
- Jos ihminen pistää itseensä prostaglandiinia, raskaana olevat naiset

voivat saada keskenmenon ja astmaattisille hengitysvaikeuksia.

- Prostaglandiinien rutiininomainen käyttö lisää tarvetta muiden lääkkeiden käytölle, esim. mikrobilääkkeet.
- Lääkkeen hinta ja piikitystyö.

Mieti tilallasi

- Ylittävätkö prostaglandiinin käytön edut siitä aiheutuvat haitat?
- Vaihtoehto usealle tilalle on se, että annetaan suurimman osan emakoista porsia normaalisti ja vain yli 116 tai 117 päivän tiineydet käynnistetään.

Prostaglandiinin käyttö

- markkinoilla useita valmisteita, käytä aina valmistajan annostusta
- Piikitä huolellisesti lihakseen, ei läskiin, sieltä se ei imeydy

