




Virikkeiden vähyys lisää hännänpurenta riskiä

Hännänpurenta on stressiin liittyvä ongelma, ja tärkeä hyvinvointi- ja terveysongelma sioilla. Taloudelliset tappiot ovat jopa 20–40 €/purtu sika.

Purruilla sioilla yleensä muitakin vaivoja


Purruilla sioilla havaitaan tavallista enemmän myös muita terveysongelmia (kuva). Yhteys on todettu mm. keuhko- ja jalkavaurioiden sekä hengitystiesairauksien ja hännänpurenta esiintyvyyteen välillä. Lääkinnästä ja ruohohylkäyksistä aiheutuva kustannus voi olla merkittävä



Häntävaurioinen sika kasvaa heikommin

Häntänsä vaurioittaneilla sioilla on enemmän ruohohylkäyksiä kuin tervehäntäisillä sioilla. Lisäksi hännänpurenta on eräs hylkäyssyy lihantarkastuksessa. Osaruohohylkäyksen kohdanneesta ruhosta saataan maksaa alempaa tuottajahintaa

Purennasta kärsivät siat kasvavat muita heikommin. Ero on 20-50 grammaa (kuva). Lisäksi permälään keskimääräistä heikomman siat joutuvat ovat muita todennäköisemmin hännänpurenta uhriksi.



Mitä voit tehdä purenta vähentämiseksi?

- **Jos havaitset purentaa, puutu tilanteeseen välittömästi**, sillä purenta voi puhjeta epidemiaksi. Jos karsinassa havaitaan oireita, on tärkeää reagoida lisävahinkojen estämiseksi ja riskitekijöiden poistamiseksi, sillä jo yhden oireen esiintyminen viittaa kohonneeseen riskiin. Etenkin ilmasto- ja tms. häiriötilanteissa on toimittava ripeästi.
- Mikäli mahdollista, poista purija ja uhri karsinasta
- **Tarjoa sioille virikkeitä ja olkea.**
- Huolehdi, että sikalan lämpötila on sopiva ja että vettä ja rehua on **kaikkien** sikojen saatavilla.
- Älä pidä sikoja liian ahtaassa karsinassa
- Huolehdi sikojen terveydestä
- Vältä sikaryhmien sekoittamista